


Manuellt tryck – Snabbguide för infusion*

STEG 1 Gör dig redo

1 Rengör ytan.




2 Ta fram rätt utrustning.

3 Tvätta händerna.



4 Kontrollera flaskorna.

Lösningen ska vara klar och svagt gul till ljusbrun. Kontrollera så att inga partiklar eller missfärgningar finns.




Skall inte användas om:


- ✗ Lösningen är grumlig, innehåller partiklar eller är missfärgad.
- ✗ Utgångsdatum har passerats.
- ✗ Läkemedlet har varit fryst.

STEG 2 Förbered infusionen

1 Ta bort skyddshylsan.






2 Rengör locket på flaskan med en spritservett.



3 Överför till sprutan.


Om du använder **överföringsset**, följ instruktionerna från utrustningstillverkaren. Fäst sprutan på uppdragningskanylen. Vänd flaskan och uppdragningskanylen upp och ner. Se till att spetsen på kanylen hela tiden är täckt av lösningen. Om du får bubblor i flaskan, vänta några sekunder så minskar de. Fyll sprutan genom att försiktigt dra kolven nedåt. När sprutan är fylld lossa kanylen. Tryck ut luften ur sprutan genom att trycka lätt på kolven tills all luft är ute. Små luftbubblor är inte farligt. Gå sedan till **STEG 3**.

Om du använder flera injektionsflaskor för att uppnå önskad dos, upprepas detta steg. Gå sedan till **STEG 3**.





STEG 3 Infundera



1 Sätt fast infusionsnålens slang på sprutan. Tryck ur all luft i den.




2 Förbered injektionsställe.




3 Stick in nålen/nålarna.



4 Starta infusionen.



STEG 4 Registrera och städa upp



1 Registrera infusionen.



2 Städa upp.

Prata med din läkare eller sjukvårdspersonal om du upplever problem med administreringen. Använd alltid detta läkemedel enligt instruktion från din läkare.

Efter att vårdpersonal gett dig utbildning i hemmabehandling med Hizentra, kan denna instruktion användas som förberedelse av infusionen.

Fråga din läkare eller sjukvårdspersonal om du har några frågor eller behöver mer information.


*Detta är inte en komplett användarmanual. Läs bipacksedeln noggrant för detaljerad information.

CSL Behring tar inget ansvar för specifika pumpar eller nålar tillverkade av andra företag. För frågor angående dessa, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Hizentra tillverkas av CSL Behring AB.

Infusionspump – Snabbguide för infusion*

STEG 1 Gör dig redo

1 Rengör ytan.




2 Ta fram rätt utrustning.

3 Tvätta händerna.



4 Kontrollera flaskorna.

Lösningen ska vara klar och svagt gul till ljusbrun. Kontrollera så att inga partiklar eller missfärgningar finns.




Skall inte användas om:


- ✗ Lösningen är grumlig, innehåller partiklar eller är missfärgad.
- ✗ Utgångsdatum har passerats.
- ✗ Läkemedlet har varit fryst.

STEG 2 Förbered infusionen

1 Ta bort skyddshylsan.






2 Rengör locket på flaskan med en spritservett.



3 Överför till sprutan.


Om du använder **överföringsset**, följ instruktionerna från utrustningstillverkaren. Fäst sprutan på uppdragningskanylen. Vänd flaskan och uppdragningskanylen upp och ner. Se till att spetsen på kanylen hela tiden är täckt av lösningen. Om du får bubblor i flaskan, vänta några sekunder så minskar de. Fyll sprutan genom att försiktigt dra kolven nedåt. När sprutan är fylld lossa kanylen. Tryck ut luften ur sprutan genom att trycka lätt på kolven tills all luft är ute. Små luftbubblor är inte farligt. Gå sedan till **STEG 3**.

Om du använder flera injektionsflaskor för att uppnå önskad dos, upprepas detta steg. Gå sedan till **STEG 3**.





STEG 3 Infundera



1 Förbeded pumpen och infusionsnålen. Tryck ur all luft i den.



2 Förbered injektionsställe.




3 Stick in nålen/nålarna.



4 Starta infusionen.

STEG 4 Registrera och städa upp



1 Registrera infusionen.



2 Städa upp.

Prata med din läkare eller sjukvårdspersonal om du upplever problem med administreringen. Använd alltid detta läkemedel enligt instruktion från din läkare.

Efter att vårdpersonal gett dig utbildning i hemmabehandling med Hizentra, kan denna instruktion användas som förberedelse av infusionen.

Fråga din läkare eller sjukvårdspersonal om du har några frågor eller behöver mer information.

*Detta är inte en komplett användarmanual. Läs bipacksedeln noggrant för detaljerad information.

CSL Behring tar inget ansvar för specifika pumpar eller nålar tillverkade av andra företag. För frågor angående dessa, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Hizentra tillverkas av CSL Behring AB.